

REVISIÓN DE LOS PRINCIPALES FACTORES ASOCIADOS EN UNA MUESTRA DE PACIENTES CON DESORDEN EMOCIONAL EN PERIODO POSTPARTO

Isabel Reyes de Uribe Zorita, Psicóloga clínica, Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid
Mónica Avellón Calvo, Psicóloga Clínica, USMIJ, HURH, Valladolid
Cristina Catalina Fernández, Psicóloga Clínica, HURH, Valladolid
Amaia Izquierdo Elizo, Psicóloga clínica, USMIJ, HURH, Valladolid
María Luisa López Lucas, Psiquiatra, HURH, Valladolid
Khouloud El Hajoui Rouaz, residente psicología clínica, HURH, Valladolid



INTRODUCCIÓN

Hace un par de años se investigó acerca de los principales factores asociados a una muestra de mujeres incluidas en el programa de atención perinatal del Hospital Universitario Río Hortega, de atención psicológica para desórdenes emocionales en periodo postparto. Se presenta en esta ocasión una revisión de los datos presentados entonces, con la muestra ampliada, ya que en febrero de 2024 había 13 participantes y, en la actualidad, se ha analizado una muestra de 118 participantes.

OBJETIVO

Revisar los principales factores asociados a la sintomatología ansioso-depresiva en el postparto.


MÉTODO

Se ha analizado la proporción en la que se presentan dichos factores en la muestra actual.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Dentro de los posibles factores que en la literatura científica se han asociado a la sintomatología depresiva posparto, en la muestra analizada se encuentran como factor relevante el hecho de tener antecedentes previos, presente en casi la mitad de la muestra. Por otro lado, habría que investigar acerca del hecho de ser madre primípara ya que aparece es un factor presente en más de la mitad de la muestra.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Antúnez Ortigosa, M.; Martín, N.; Casilari Floriano, J. C.; Mérida de la Torre, F. J. (2022) Enfermería Cuidándote: La revista científica del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, ISSN-e 2695-9364, Vol. 5, Nº. 3, 2022, págs. 19-29
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8538789>

Carrasquer Alegre, Y.; Salas Peruga, M.J.; Caballu Montero, P.; Salinas Maestro, S.; Arellano Casas, E.J.; Mateo Pérez, B. (2024). Factores de riesgo relacionados con la depresión postparto: revisión bibliográfica. Revista Ocronos. Vol. VII. N.º 11–Noviembre 2024

Extraído de: <https://revistamedica.com/factores-riesgo-relacionados-depresion-postparto/>

Fermoselle Esclapez, E., Osma López, J. J., Crespo Delgado, E., Ramón Barrada, J., & Castellano Badenas, C. (2015). Factores de riesgo asociados a la aparición de alteraciones emocionales durante el periodo perinatal y el puerperio: Un estudio preliminar en una muestra de mujeres embarazadas a través de e-Health.

<http://dx.doi.org/10.6035/AgoraSalut.2015.1.25>

Lorenzo-Veigas, A. M., & Soto-González, M. (2014). Factores de riesgo de la depresión posparto. *Fisioterapia*, 36(2), 87-94.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0211563813001119>

Planelles Imbernón, M. (2023). Factores predisponentes a la depresión posparto. <http://hdl.handle.net/10234/203762>

Valleandrés Goyenechea, A. (2017). Cuidados de Enfermería en la Prevención de la Depresión Postparto. <http://hdl.handle.net/10234/203762>