

Psicosis Posparto: Identificación y Manejo de una Emergencia Psiquiátrica

Señales de Alerta y Diagnóstico




Alteraciones del Comportamiento y Pensamiento

Verborrea, conductas desorganizadas e ideas delirantes místicas sobre el bebé.



Riesgo de Daño Potencial

Presencia de ideas ambiguas sobre el bienestar del bebé que sugieren riesgo de infanticidio.



Factores de Riesgo Determinantes

Antecedentes de duelo reproductivo no resuelto o suicidio.

COMPARATIVA CLÍNICA: ANTECEDENTES VS. CRISIS ACTUAL



Antecedentes Relevantes



2 Abortos espontáneos previos



Rasgos ansioso-obsesivos



Antecedente familiar de bipolaridad



Manifestaciones Clínicas Actuales



Insomnio total y agitación psicomotriz



Delirios de "peligro por fuerzas externas"



Desconexión afectiva fluctuante con el bebé

Protocolo de Manejo Urgente



Hospitalización e Intervención Médica

Ingreso inmediato (preferiblemente unidad madre-bebé) y uso de antipsicóticos con estabilizadores del ánimo.



Estabilización del Ciclo Biológico

La regulación estricta del sueño es la clave principal para la remisión de los síntomas.



Supervisión y Vínculo

Vigilancia constante del contacto madre-hijo y psicoeducación urgente a la pareja y red de apoyo.